

PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA CON LENTE FAQUICA

No pintarse los ojos desde unos 7 días antes de la operación y tampoco usar lentes de contacto.

El día previo a la cirugía:

Lavar la cara, región peri-ocular y la piel de los párpados de ambos ojos con jabón de **Pervinox** C/ 8 hs. (tres veces)
Colocar desde la mañana al levantarse, una gota de **GATIMICIN D** (colirio) C/ 4 hs. en los dos ojos.

El día de la cirugía:

Lavarse la cara con jabón de PERVINOX. Colocar una gota de **FOTORRETIN** y una gota de **GATIMICIN D** cada 15 minutos en el ojo que se va a operar. Comenzar dos (2) horas antes al horario de la cirugía.

Colocar una gota de **GATIMICIN D** (colirio) cada 4 hs. hasta la cirugía, llevar el gotero de **GATIMICIN D** a la cirugía y no olvidar reclamarlo al retirarse del centro quirúrgico.

En el caso de ser **HIPERTENSO** medicado, tomar su medicación normalmente.

Concurrir con el pedido médico de la cirugía y la autorización correspondiente emitida por la obra social, caso contrario no será posible operarlo.

Los pacientes deberán concurrir preparados con la medicación indicada, **sin perfumes**, sin maquillaje o crema y sin pintura en los párpados.

Cirujano: Dr. Diego Croce Teléfono: +54 9 299 4687147 mail: drdiegocroce@gmail.com

El horario de concurrencia para operarse será confirmado por teléfono uno o dos días antes de la cirugía para reducir el tiempo de espera preoperatorio.

INDICACIONES POST-OPERATORIAS

Luego de la cirugía se retira con unos oclusores plásticos semi-transparentes colocados en ambos ojos que le sacaré en el momento del control post-operatorio del día siguiente.

Higiene de las manos para colocarse las gotas (Por Ej: jabón de Pervinox)

Una vez retirados los oclusores plásticos, deberá empezar a colocar nuevamente **GATIMICIN D** (colirio) en ambos ojos cada 2 horas el primer día y cada 4 hs los días subsiguientes, hasta terminar el gotero.

Luego del control de las 24 hs, los controles siguientes son a los 7 días, a los 30 días y a los tres meses.

Las gotas se colocarán con la frecuencia indicada hasta agotar el frasco gotero.

Luego de operado es normal tener sensación de basurita, que lagrimee, la visión nublada y molestias con la luz. La medicación se usa durante el día hasta última hora, no es necesario usarlos durante la noche.

Los medicamentos deben ser bien agitados antes de colocarlos y conservados en la heladera.

Si siente algo de dolor (lo cual es infrecuente) puede tomar analgésicos (por Ej.: Ibuprofeno 400mg)

En el post-operatorio, no deberá frotarse o fregarse los ojos por 15 días.

Si Ud. tiene dudas, dolor significativo, o piensa que tiene una urgencia no deje de comunicarse.